

Theorie

1. Die komplexe Einheit

→ Definition:

Komplexe Einheit $i \rightarrow \boxed{i^2 := -1} \rightarrow \text{„}i = \sqrt{-1}\text{“}$

Beispiel: Nullstellen von $x^2 + 1 = 0$

$\Rightarrow x^2 = -1 \Rightarrow x = \pm \sqrt{-1} = \pm i$
 $\Rightarrow x = \pm i$

Beispiel: Nullstellen von $x^2 + 2x + 5 = 0$

$\Rightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$
 $\Rightarrow x = -1 \pm 2i$

2. Darstellung


→ Alle komplexe Zahlen lassen sich mit Realteil und Imaginärteil beschreiben

$z \in \mathbb{C} \rightarrow z = a + bi \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a = \operatorname{Re}\{z\} = \text{Realteil von } z \\ b = \operatorname{Im}\{z\} = \text{Imaginärteil von } z \end{array} \right\} ! a, b \in \mathbb{R}$

• Da es „biwertige“ Zahlen sind („2-Dimensional“) können wir komplexe Zahlen mit einem Punkt auf zwei Achsen (Real- und Imaginärteil) eindeutig graphisch darstellen \Rightarrow Gauss'sche/Komplexe Zahlenebene

Kartesische Form


• Darstellung mit „x,y“ Koordinaten (Re, Im)



$\boxed{z = a + bi}$

Polarform I

• Darstellung mit Betrag und Winkel



$\operatorname{Re}\{z\} = r \cos(\varphi), \operatorname{Im}\{z\} = r \sin(\varphi)$

$\Rightarrow z = r \cos(\varphi) + i r \sin(\varphi)$

$= r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) \rightarrow$

$\boxed{z = r \cos(\varphi) + r i \sin(\varphi) = r \operatorname{cis}(\varphi)}$

! Nicht alle kennen die Cis-Form

Polarform II

• Darstellung mit Betrag und Winkel + Eulersche Identität

Eulersche Identität:

$\boxed{e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)}$

$[e^{i\varphi} = e^{i\varphi + 2\pi n i}, n \in \mathbb{Z}]$
 $\hookrightarrow 2\pi$ -periodisch

• da $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$

$\Rightarrow \boxed{z = r e^{i\varphi}}$


	Kartesische Form	Polarform
Realteil $\operatorname{Re}\{z\}$	a	$r \cos(\varphi)$
Imaginärteil $\operatorname{Im}\{z\}$	b	$r \sin(\varphi)$
Betrag $ z $	$\sqrt{a^2 + b^2}$	r
Argument $\arg(z)$	$\tan^{-1}(b/a)$	φ

3. Konjugation

→ komplexe Konjugation ist definiert als die Abbildung

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z = a + bi \mapsto \bar{z} = a - bi$$

Kartesische Form	$z = a + bi$	$\Rightarrow \bar{z} = a - bi$
Polarform	$z = r \cos(\varphi) + r \sin(\varphi)$	$\Rightarrow \bar{z} = r \cos(\varphi) - r \sin(\varphi)$
	$z = r e^{i\varphi}$	$\Rightarrow \bar{z} = r e^{-i\varphi}$



• Eigenschaften

1. $z + \bar{z} = a + bi + a - bi = 2a = 2 \operatorname{Re}\{z\}$
2. $z - \bar{z} = a + bi - a + bi = 2bi = 2i \operatorname{Im}\{z\}$
3. $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = r^2 = |z|^2$

4. Moivre'scher Satz

$$\rightarrow [\cos(x) + i \sin(x)]^n = \cos(nx) + i \sin(nx) \rightarrow [\cos(x) + i \sin(x)]^n = [e^{ix}]^n = e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

→ Polynome mit Grad q haben genau q Nullstellen

Beispiel: $z^4 + 2z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0 \Rightarrow (z+1)^2(z^2+1) = 0 \rightarrow z = -1, -1, +i, -i$ (4 Nullstellen, 2 gleiche)

→ Falls ein Polynom mit reellen Koeffizienten eine komplexe Nullstelle z hat, dann ist ihre konjugierte komplexe Zahl \bar{z} auch eine Nullstelle

Beispiel: $z^4 + 2z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0 \rightarrow$ gegeben ist eine Nullstelle $z = +i \Rightarrow z' = \bar{z} = -i$ ist auch eine Nullstelle, da es nur reelle Koeffizienten hat

Beispiel: $z^4 = i$ Finde alle Nullstellen

• Wir wissen, dass es 4 Nullstellen gibt

• $i = e^{\frac{\pi}{2}i}$

• Komplexe Exponentialfunktion ist 2π -periodisch $\rightarrow i = e^{\frac{\pi}{2}i} = e^{\frac{\pi}{2}i + 2\pi in}, n \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow z^4 = i$$

$$z^4 = e^{\frac{\pi}{2}i + 2\pi ni}$$


$$(z^4)^{1/4} = (e^{\frac{\pi}{2}i + 2\pi ni})^{1/4} = e^{\frac{\pi}{8}i + \frac{1}{2}\pi ni} \Rightarrow z = e^{\frac{\pi i + 4\pi ni}{8}}$$

Setzen wir Werte für $n = [0, 1, 2, 3]$

Nur 4 Werte, da wir 4 Nullstellen haben

↳ für $n=4 \rightarrow z = e^{\frac{17\pi}{8}i} = e^{2\pi i + \frac{\pi}{8}i} = e^{\frac{\pi}{8}i}$

$$\left\{ \begin{array}{l} z_1 = e^{\frac{\pi}{8}i} \\ z_2 = e^{\frac{5\pi}{8}i} \\ z_3 = e^{\frac{9\pi}{8}i} \\ z_4 = e^{\frac{13\pi}{8}i} \end{array} \right.$$



• Nullstellen sind alle gleich verteilt.

• für $z^n = a, a \in \mathbb{C}$ gilt also

• Nullstellen haben einen Zwischenwinkel von $\frac{2\pi}{n}$

• Erste Nullstelle bei $a^{1/n}$

⇒ Haben wir den Grad (n) und eine Nullstelle, so können wir ganz einfach die restlichen $n-1$ Nullstellen finden