

## Basisprüfung Lineare Algebra

Name		Note
Vorname		
Studiengang		
Leginummer		
Datum	Montag, 5. Februar 2018	

1	2	3	4	5	6	Total
6 P	6 P	6 P	6 P	6 P	6 P	36 P

### Wichtige Hinweise:

- *Dieses Deckblatt darf erst auf Anweisung des Assistenten umgeblättert werden!*
- Bitte füllen Sie zuerst dieses Deckblatt aus.
- Schalten Sie Ihr Handy aus und verstauen Sie es in Ihrer Tasche.
- Legen Sie Ihre **Legi** auf den Tisch.
- Prüfungsdauer: **120 Minuten**.
- Erlaubte Hilfsmittel: **Keine**.
- Alle Aufgaben werden gleich gewichtet (jeweils 6 Punkte).
- Begründen Sie Ihre Aussagen. Nicht motivierte Lösungen werden nicht akzeptiert! Davon ausgenommen ist nur Aufgabe 6 (Multiple-Choice-Aufgabe).
- Tragen Sie die Lösung von Aufgabe 6 (Multiple-Choice-Aufgabe) auf dem Extrablatt (letzte Seite dieser Prüfung) ein.
- Beginnen Sie jede der sechs Aufgaben auf einer neuen Seite und schreiben Sie Ihren Namen auf **alle** Blätter.
- Bitte nicht mit Bleistift / Rot / Grün schreiben!
- Versuchen Sie, Ihren Lösungsweg möglichst klar darzustellen, und arbeiten Sie sorgfältig.

**Viel Erfolg!**

1. [6 Punkte] Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

- a) [1 Punkt] Zeigen Sie, dass die Spaltenvektoren von  $A$  orthogonal sind.
- b) [1.5 Punkte] Zeigen Sie, dass die Spaltenvektoren von  $A$  linear unabhängig sind.
- c) [3.5 Punkte] Geben Sie eine QR-Zerlegung von  $A$  an.

2. [6 Punkte] Gegeben sei das Differentialgleichungssystem erster Ordnung  $\dot{y} = Ay$ , wobei

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- a) [2.5 Punkte] Bestimmen Sie eine Transformationsmatrix  $T$  und eine Diagonalmatrix  $D$ , so dass  $A = TDT^{-1}$ .
- b) [2 Punkte] Bestimmen Sie die allgemeine Lösung des Differentialgleichungssystems  $\dot{y} = Ay$ , indem Sie die neuen Variablen  $x(t) = T^{-1}y(t)$  einführen.

**Hinweis:** Für  $a \in \mathbb{R}$  ist die allgemeine Lösung der Differentialgleichung  $\dot{z} = az$  gegeben durch  $z(t) = ce^{at}$  mit einer Konstanten  $c \in \mathbb{R}$ . Zum Beispiel gilt für  $a = -2$ : Die Differentialgleichung  $\dot{z} = -2z$  hat die Lösung  $z(t) = ce^{-2t}$ , wobei die Konstante  $c$  aus der Anfangsbedingung  $z(0) = c$  bestimmt werden kann.

- c) [1.5 Punkte] Bestimmen Sie die spezielle Lösung des Differentialgleichungssystems  $\dot{y} = Ay$  zu den Anfangsbedingungen

$$y(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

3. [6 Punkte] Gegeben sei das folgende Ausgleichsproblem: Finde  $x \in \mathbb{R}^2$ , so dass

$$\|Ax - b\|_2 = \min_{v \in \mathbb{R}^2} \|Av - b\|_2, \quad (1)$$

wobei

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \\ 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- a) [5 Punkte] Lösen Sie (1) mithilfe einer Singulärwertzerlegung.
- b) [1 Punkt] Schreiben Sie die Normalgleichungen für (1) in kompakter Form und lösen Sie sie.

**Siehe nächstes Blatt!**

4. [6 Punkte] Seien  $\mathcal{G}_3 = \text{span}\{1, t^2, t^4\}$  und  $\mathcal{U}_2 = \text{span}\{t, t^3\}$  zwei Vektorräume von Polynomen. Betrachten Sie die folgende Abbildung  $\mathcal{A}$  von  $\mathcal{G}_3$  nach  $\mathcal{U}_2$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}: \mathcal{G}_3 &\longrightarrow \mathcal{U}_2 \\ x(t) &\longmapsto t x''(t), \end{aligned}$$

das heisst, für  $x \in \mathcal{G}_3$  ist  $\mathcal{A}x \in \mathcal{U}_2$  gegeben durch  $(\mathcal{A}x)(t) = t x''(t)$ .

- a) [1 Punkt] Zeigen Sie, dass  $\mathcal{A}$  eine lineare Abbildung ist.
- b) [1 Punkt] Durch welche Matrix  $A$  wird  $\mathcal{A}$  beschrieben, wenn wir die Monome als Basen in beiden Räumen verwenden?
- c) [2 Punkte] Zeigen Sie, dass  $\{p_1, p_2, p_3\}$  und  $\{q_1, q_2\}$  Basen von  $\mathcal{G}_3$  beziehungsweise  $\mathcal{U}_2$  sind, wobei
- $$p_1(t) = 1 + t^2, \quad p_2(t) = 1 - t^2, \quad p_3(t) = 1 + t^2 + t^4$$
- und
- $$q_1(t) = t, \quad q_2(t) = 3t + 2t^3.$$
- d) [2 Punkte] Welches ist die neue Matrix  $B$ , durch die  $\mathcal{A}$  nach dem Basiswechsel in die neuen Basen  $\{p_1, p_2, p_3\}$  und  $\{q_1, q_2\}$  aus Teilaufgabe c) beschrieben wird?

5. [6 Punkte] Sei  $n \in \mathbb{N}$  und sei  $v \in \mathbb{R}^n$  mit  $v \neq 0$ . In dieser Aufgabe betrachten wir die Matrix

$$H = I - \frac{2}{v^T v} v v^T \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

wobei  $I$  die  $n$ -dimensionale Einheitsmatrix ist.

- a) [4 Punkte] Beweisen Sie, dass  $H$  eine Orthogonalmatrix ist.
- b) [2 Punkte] Beweisen Sie, dass  $H^2 = I$  gilt.

6. [6 Punkte] Multiple-Choice: Auf dem Extrablatt "Richtig" oder "Falsch" ankreuzen.

- a) [1 Punkt] Ein lineares Gleichungssystem mit  $m$  Zeilen,  $n$  Spalten und Rang  $r$  ist *nicht* für beliebige rechte Seiten lösbar, wenn  $m > n$ .
- b) [1 Punkt] Sei  $A$  eine  $m \times n$ -Matrix mit  $m > n$ , so dass  $A^T A$  die Einheitsmatrix ist, und sei  $B$  eine  $n \times m$ -Matrix, so dass  $BA$  orthogonal ist. Dann ist auch  $AB$  orthogonal.
- c) [1 Punkt] In jedem Vektorraum mit Skalarprodukt können wir eine beliebig grosse Familie von Einheitsvektoren finden, die paarweise orthogonal sind.
- d) [1 Punkt] Eine LR-Zerlegung der Matrix  $A$  liefert die Rechtsdreiecksmatrix

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}.$$

Daraus folgt  $\det A = 25$ .

- e) [1 Punkt] Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

und die Menge  $L = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^2\}$ . Dann ist  $L$  ein Unterraum des Vektorraums  $\mathbb{R}^3$  und die Vektoren  $a^{(1)} = [1, 0, 2]^T$  und  $a^{(2)} = [0, 1, -3]^T$  bilden ein Erzeugendensystem von  $L$ .

- f) [1 Punkt] Sei  $\{a^{(1)}, \dots, a^{(k)}\} \subseteq \mathbb{R}^n$  eine Basis von  $\mathbb{R}^n$ . Dann muss gelten  $k \leq n$ .

## Extrablatt: Aufgabe 6

**Name:** \_\_\_\_\_

Tragen Sie auf dieses Extrablatt die Lösungen zu den “Richtig oder Falsch”-Fragen aus Aufgabe 6 ein, indem Sie das Kästchen **ankreuzen**, welches der korrekten Antwort entspricht. Tragen Sie oben Ihren Namen ein.

**Bewertungsschema:** Jede *korrekte* Antwort gibt einen Punkt, jedes *nicht korrekt gesetzte* Kreuz gibt einen Punkt Abzug. Für jede Teilaufgabe, für die *kein Kreuz* gemacht wurde, gibt es 0 Punkte. Die Summe der Punktzahlen für die ganze Aufgabe 6 wird, falls negativ, auf 0 aufgerundet.

Teilaufgabe	Richtig	Falsch
a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>