


Übung 05 (21.03.25)

Feedback zur Übungsstunde geben! (Link per E-Mail erhalten)

Recap

Orthonormalbasis (ONB)



Bei einer Orthonormalbasis stehen die Basisvektoren senkrecht zueinander (orthogonal) und haben die Länge 1 (normal).

z.B.:


$$e = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Will man einen Vektor in dieser Basis darstellen, dann kann ihn einfach orthogonal projizieren.

Orthonormalprojektion:

Wie Ihr bereits in der BAB hergeleitet habt, lässt sich ein Vektor w auf einen Vektor v wie folgt orthogonal projizieren.

$$w' = \frac{\langle w, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v$$




Bei einer herkömmlichen Basis müssen die Basisvektoren weder orthogonal noch normal sein.

z.B.:

$$b = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Will man einen Vektor in dieser Basis darstellen, dann kann ihn nicht orthogonal projizieren. (LGS lösen)



Sei e_1, \dots, e_n eine Orthonormalbasis des Vektorraums V , dann gilt $\forall x \in V$:

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$$

Gram-Schmidt-Orthogonalisierungsverfahren:

Dafür benötigen wir: eine beliebige Basis $B = \{b_1, \dots, b_k\}$

ein beliebiges Skalarprodukt

und produzieren damit eine Orthonormalbasis $E = \{e_1, \dots, e_k\}$

i.) Wähle einen beliebigen ersten Basisvektor b_1 und normiere ihn.

$$e_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{b_1}{\sqrt{\langle b_1, b_1 \rangle}}$$

ii.) Wähle einen zweiten Basisvektor b_2 , ziehe zuerst den zu b_1 parallelen Teil ab

$$e'_2 = b_2 - \langle b_2, e_1 \rangle e_1$$

und normiere ihn dann

$$e_2 = \frac{e'_2}{\|e'_2\|} = \frac{e'_2}{\sqrt{\langle e'_2, e'_2 \rangle}}$$

iii.) Wiederhole für jeden weiteren Basisvektor b_i

$$e'_i = b_i - \langle b_i, e_1 \rangle e_1 - \langle b_i, e_2 \rangle e_2 - \dots - \langle b_i, e_{i-1} \rangle e_{i-1}$$

$$e_i = \frac{e'_i}{\|e'_i\|} = \frac{e'_i}{\sqrt{\langle e'_i, e'_i \rangle}}$$

Das kommt SEHR oft bei Prüfungen dran!


Bild

Ganz am Anfang von LinAlg I sahen wir die Matrix-Vektor-Multiplikation

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix} x_3$$


Das heißt der „erreichbare Bereich“ von Ax wird durch die Linearkombination der Spalten von A beschrieben. Zum Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} x_2$$

Dieser „erreichbare Bereich“ nennt sich **Bild** einer Matrix. Die Dimension des Bildes ist der Rang.

Mathematisch formuliert:

$$\text{Bild}(A) = \{ y \in \mathbb{R}^m \mid \exists x \in \mathbb{R}^n \text{ sodass } y = Ax \} \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Folgende Aussagen sind für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ äquivalent:

- A hat vollen Rang
- $Ax = b$ besitzt eine eindeutige Lösung
- $Ax = b$ ist für beliebiges b lösbar
- Das homogene LGS $Ax = 0$ hat nur die triviale Lösung ($x = 0$)
- A ist invertierbar/regulär
- $\det(A) \neq 0$
- Zeilen/Spalten sind linear unabhängig
- Spalten von A sind eine Basis von \mathbb{R}^n
- Das Bild von A ist n -Dimensional

Bsp.: Bestimme ein Erzeugendensystem für das Bild von A

• **Bild bestimmen:** $Bild = span\{a^{(1)}, a^{(2)} \dots a^{(n)}\}$
Ist nach einem Erzeugendensystem gefragt, reicht es, einfach die Spaltenvektoren hinzuschreiben.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow Bild(A) = \left\{ \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \right\}$$

Bestimme eine Basis für das Bild von A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

Aus Erzeugendensystem Basis finden:

- ① Matrix aufstellen, deren Zeilen aus den transponierten erzeugenden Vektoren besteht.
- ② Mit Gaußalgorithmus in Zeilenstufenform bringen. Dadurch wird lineare Abhängigkeit eliminiert.
- ③ Die verbleibenden Nicht-Nullzeilen sind Basisvektoren.

Nach Rezept:

$$i: \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{ii.) Gauss}} \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \quad Bild(A) = \left\{ \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \right\}$$

Wir können sehen, dass . Die Dimension des Bildes ist gleich der Anzahl Basisvektoren des Bildes.


Kern

Wie gerade gesehen, beschreibt das Bild einer Matrix den Raum auf welchen beliebige Vektoren x durch A abgebildet werden.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$




Wir fragen uns nun ob es Vektoren gibt die auf Null abgebildet werden.

D.h. wir suchen alle x , sodass

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



Mathematisch formuliert: $\text{Kern}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$

Bsp.: Bestimme den Kern von $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Löse das HLGs:

$$Ax=0 \rightarrow \begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{array} = \begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ & & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} x_2 = \\ x_1 = \end{array} \rightarrow \text{Kern}(A) = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix} \right\}$$



Zusammenhang mit LGS:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Rang voll}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{Rang nicht voll}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_2 \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} x_2 \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$




Folgende Aussagen sind für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ äquivalent:

- A hat vollen Rang
- $Ax = b$ besitzt eine eindeutige Lösung
- $Ax = b$ ist für beliebiges b lösbar
- Das homogene LGS $Ax = 0$ hat nur die triviale Lösung ($x = 0$)
- A ist invertierbar/regulär
- $\det(A) \neq 0$
- Zeilen/Spalten sind linear unabhängig
- Spalten von A sind eine Basis von \mathbb{R}^n
- Das Bild von A ist n -Dimensional
- Der Kern von A besteht nur aus dem Nullvektor

Zusammenhang mit Eigenvektoren/werten:

Recall: Wir fragen uns, ob es bestimmte Eingabevektoren x gibt, welche durch die Abbildung $x \mapsto Ax$ nur um einen Faktor λ gestreckt bzw. gestaucht werden.



Wenn ein Eigenwert Null ist, dann gibt es Vektoren (die nicht der Nullvektor sind) die auf Null abgebildet werden. Dann ist der Rang von A

Folgende Aussagen sind für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ äquivalent:

- A hat vollen Rang
- $Ax = b$ besitzt eine eindeutige Lösung
- $Ax = b$ ist für beliebiges b lösbar
- Das homogene LGS $Ax = 0$ hat nur die triviale Lösung ($x = 0$)
- A ist invertierbar/regulär
- $\det(A) \neq 0$
- Zeilen/Spalten sind linear unabhängig
- Spalten von A sind eine Basis von \mathbb{R}^n
- Das Bild von A ist n-Dimensional
- Der Kern von A besteht nur aus dem Nullvektor
- Kein Eigenwert von A ist 0

Beziehung zwischen Kern und Bild

$$i.) \dim(\text{Kern}) + \dim(\text{Bild}) = n$$

Intuition in 2-D graphisch


Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $v \in \mathbb{R}^n$. Ausserdem sei $Av = w$.

Wir können nun v in zwei Komponenten zerlegen.

$$\left. \begin{array}{l} \hat{v} \in \text{Kern}(A) \\ \bar{v} \text{ orthogonal zu } \hat{v} \end{array} \right\} v = \hat{v} + \bar{v}$$

Dadurch:

$$Av = A(\hat{v} + \bar{v}) = A\hat{v} + A\bar{v} = A\bar{v} = w$$



i.) Der Kern und der zum Kern orthogonale Unterraum haben zusammen die Dimension n , da $v = \hat{v} + \bar{v}$

ii.) Jeder Vektor im zum Kern orthogonalen Unterraum korrespondiert zu einem eindeutigen Vektor im Bild und umgekehrt, da $A\bar{v} = w$

Die Dimension vom zum Kern orthogonalen Unterraum ist also gleich der Dimension des Bildes.

Zusammen:

$$\dim(\text{Kern}) + \dim(\text{Bild}) = n$$

Mathematisch:

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

Der **Kern** von A ist die Lösungsmenge des HLGs $Ax=0$. Diese Lösungsmenge hat $n-r$ freie Parameter. Dabei ist r der Rang von A (Anzahl Pivots).

$$\text{z.B. } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 9 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 0 \\ 4 & 3 & 9 & 0 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -5 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} x_3 = t, x_2 = -\frac{7}{5}t, x_1 = -\frac{6}{5}t \\ r = 2 \quad n = 3 \quad n - r = 1 \end{array}$$

Der Lösungsraum von $Ax=0$ hat also die Dimension 1. Damit hat auch der **Kern** die Dimension 1.

$$\dim(\text{Kern } A) = n - r$$

Durch das Gaussverfahren zum Lösen von $Ax=0$ haben wir die Zeilenstufenform R von A gefunden. Die **Bilder** von A und R lassen sich durch die jeweiligen Spalten beschreiben

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 9 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Bild}(A) = \text{span}\{a^{(1)}, a^{(2)}, a^{(3)}\} = \text{Bild}(R) = \text{span}\{r^{(1)}, r^{(2)}, r^{(3)}\}$$

Da A und R die selbe Lösungsmenge beschreiben, spannen sie auch den selben Raum auf.

Dadurch haben sie die selbe Dimension.

Die Dimension von R ist einfach zu bestimmen da sie gleich dem Rang r ist.

$$\dim(\text{Bild}(A)) = \dim(\text{Bild}(R)) = r$$

Dadurch ist $\dim(\text{Kern } A) + \dim(\text{Bild } A) = n - r + r = n$

$$\dim(\text{Kern } A) + \dim(\text{Bild } A) = n$$

ii.) $\text{Kern}(A^T) \perp \text{Bild}(A)$

Intuition:

$$A = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \hline \end{pmatrix}$$


Spalten von $A = \text{Bild}$

$$A^T y = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | \\ \hline \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$y = \text{Kern von } A^T$

Skalarprodukte von Spaltenvektoren von A mit Kern von A^T sind 0!

"Graphisch:"



Fredholm Alternative: $Ax = b$ ist lösbar (b liegt im Bild) genau dann, wenn b senkrecht auf allen Lösungen des adjungierten LGS $A^T \cdot y = 0$ steht.

Beispielaufgabe

1.) Sei

$$\mathcal{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x_1, x_2)^T \mapsto x_1 - x_2$$

Finden sie den Kern und das Bild von \mathcal{F}

i.) Abbildungsmatrix A finden:

ii.) $\text{Ker}(A)$:

iii.) $\text{Bild}(A) = \text{Im}(A) =$

→ Stimmen Dimensionen?

$$n = 2$$

$$\dim(\text{Ker}(A)) =$$

$$\dim(\text{Im}(A)) =$$

Tipps zur Serie

1. - 5. MC Aufgaben

4.) Übungsunterlagen anschauen.

6.) Vorgehen wie in der Übung

7.) Mehr dazu nächste Woche: Überleg dir, worauf die Vektoren $(1,0,0)^T$, $(0,1,0)^T$, $(0,0,1)^T$ durch eine Multiplikation abgebildet werden. Wenn man eine Matrix mit $(1,0,0)^T$ multipliziert, ist das Ergebnis die erste Spalte von A. So könnt ihr A konstruieren.

Graphisch überlegen!

8.) a.) Axiome prüfen

b.) Wie bei 7.a.)