

# Theorie

## 1. Einführung

### 1.1 Die komplexe Einheit

→ Definition:

$$\text{komplexe Einheit } i \rightarrow \boxed{i^2 := -1} \rightsquigarrow \text{„}i = \sqrt{-1}\text{“}$$

Beispiel: Nullstellen von  $x^2 + 1 = 0$

$$\Rightarrow x^2 = -1 \Rightarrow x = \pm \sqrt{-1} = \pm i$$

$$\Rightarrow x = \pm i$$

Beispiel: Nullstellen von  $x^2 + 2x + 5 = 0$

$$\Rightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$$

$$\Rightarrow x = -1 \pm 2i$$

### 1.2 Darstellung


→ Alle komplexe Zahlen lassen sich mit Realteil und Imaginärteil beschreiben

$$z \in \mathbb{C} \rightarrow z = a + bi \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a = \operatorname{Re}\{z\} = \text{Realteil von } z \\ b = \operatorname{Im}\{z\} = \text{Imaginärteil von } z \end{array} \right\} ! a, b \in \mathbb{R}$$

• Da es „biwertige“ Zahlen sind („2-Dimensional“) können wir komplexe Zahlen mit einem Punkt auf zwei Achsen (Real- und Imaginärteil) eindeutig graphisch darstellen  $\Rightarrow$  Gauss'sche / Komplexe Zahlenebene

#### Kartesische Form


• „x, y“ Koordinaten (Re, Im)



$$\boxed{z = a + bi}$$

#### Polarform I

• Betrag und Winkel (|z|, arg(z))



$$\operatorname{Re}\{z\} = r \cos(\varphi), \operatorname{Im}\{z\} = r \sin(\varphi)$$

$$\boxed{z = r [\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)]}$$

#### Polarform II

• Eulersche Identität

$$\boxed{e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)}$$

• Da  $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$

$$\Rightarrow \boxed{z = r e^{i\varphi}}$$

	Kart. Form	Polarform
Realteil $\operatorname{Re}\{z\}$	$a$	$r \cos(\varphi)$
Imaginärteil $\operatorname{Im}\{z\}$	$b$	$r \sin(\varphi)$
Betrag $ z $	$\sqrt{a^2 + b^2}$	$r$
Argument $\arg(z)$	$\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$	$\varphi$


### 1.3 Konjugation

→ Komplexe Konjugation ist definiert als die Abbildung  $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $z = a + bi \mapsto \bar{z} = a - bi$

Kartesische Form  $z = a + bi \Rightarrow \bar{z} = a - bi$

Polarform  $\begin{cases} z = r \cos(\varphi) + i r \sin(\varphi) \\ z = r e^{i\varphi} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{z} = r \cos(\varphi) - i r \sin(\varphi) \\ \bar{z} = r e^{-i\varphi} \end{cases}$

$z \rightarrow \bar{z} \Rightarrow$  Spiegelung um die Realachse ←



• Eigenschaften

- $z + \bar{z} = a + bi + a - bi = 2a = 2 \operatorname{Re}\{z\}$
- $z - \bar{z} = a + bi - a + bi = 2bi = 2i \operatorname{Im}\{z\}$
- $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = r^2 = |z|^2$

### 1.4 Moivrescher Satz

$$[\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)]^n = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)$$

$$[r e^{i\varphi}]^n = r^n e^{i \cdot n \cdot \varphi}$$

→ Polynome mit Grad  $q$  haben genau  $q$  Nullstellen

→ Falls ein Polynom mit reellen Koeffizienten eine komplexe Nullstelle  $z_0$  hat, dann ist ihre konjugierte komplexe Zahl  $\bar{z}_0$  auch eine Nullstelle [Beispiel 1.4.1]

→ Nullstellen von  $z^n = a$ ,  $a \in \mathbb{C}$

- Muss  $n$  Nullstellen haben
- $|a| = r_0$ ,  $\arg(a) = \varphi_0$
- $2\pi$ -Periodizität:  $r_0 e^{i\varphi_0 + 2\pi i k} = r_0 e^{i\varphi_0}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )

$$\Rightarrow z_k = \sqrt[n]{r_0} e^{i \left( \frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n} \right)}$$

( $k = \{0, 1, \dots, n-1\}$ )

[Beispiel 1.4.2]

## 1.5 Konventionen

→ Es ist eine Konvention alle komplexe Zahlen in kartesische oder Polarform darzustellen

→ **Brüche**: Falls eine komplexe Zahl im Nenner gibt, so können wir den Bruch nicht direkt in kartesische Form darstellen

• Um das zu lösen, verwenden wir die Eigenschaft  $z \cdot \bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$

•  $\frac{1}{z} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$  [Beispiel 1.5.1]

## 1.6 Cos, Sin, Log

→  $\cos(z)$ ,  $\sin(z)$

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

→ Logarithmus

• Eigenschaften

1.  $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$

2.  $\log(a^n) = n \log(a)$

3.  $e^{\ln(a)} = a \Rightarrow \ln(e^{i\varphi}) = i\varphi$

4.  $z = re^{i\varphi} \Rightarrow \ln(z) = \ln(r) + i\varphi$   
 $= \ln(|z|) + i \cdot \arg(z)$

[Beispiel 1.6.1]

## 2. Funktionen

### 2.1 Komplexe Funktionen

→ Funktion  $f: U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $z \mapsto f(z)$

→ Wir können komplexe Funktionen als eine zweidimensionale Funktion betrachten [Beispiel 2.1.1]

$$\left. \begin{aligned} f(z) &= u(z) + i v(z) \\ f(x+yi) &= u(x+yi) + i v(x+yi) \\ \tilde{f}(x, y) &= \tilde{u}(x, y) + i \tilde{v}(x, y) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} u(z) &= \tilde{u}(x, y) = \operatorname{Re}\{f(z)\} \text{ Realteil der Abbildung} \\ v(z) &= \tilde{v}(x, y) = \operatorname{Im}\{f(z)\} \text{ Imaginärteil der Abbildung} \end{aligned}$$

$$\underbrace{f(z) = f(x+yi)}_{\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}} = \underbrace{\tilde{f}(x, y)}_{\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2}$$

### 2.2 Cauchy-Riemannsche Gleichungen

→ Theorem: Eine komplexe Funktion  $f: U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  ist genau dann holomorph wenn die Cauchy-Riemannschen Gleichungen erfüllt sind [Beispiel 2.2.1]

$$f(z) = f(x+yi) = u(x+yi) + i v(x+yi)$$

Methode 1

- Partielle Ableitungen von  $f(x+yi)$

$$i \frac{\partial}{\partial x} f(x+yi) = \frac{\partial}{\partial y} f(x+yi)$$

[Beweis 2.2.1]

[Beispiel 2.2.1]

Methode 2

- Partielle Ableitungen von  $\operatorname{Re}\{f\}$  bzw  $\operatorname{Im}\{f\}$

$$\frac{\partial}{\partial x} u(x+yi) = \frac{\partial}{\partial y} v(x+yi)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} u(x+yi) = -\frac{\partial}{\partial x} v(x+yi)$$

[Beweis 2.2.2]




holomorph = komplex differenzierbar = analytisch



### 3. Integrale

#### 3.1 Kurvenintegrale

→ Wir wollen das Integral einer bestimmten Abbildung  $f(z)$  auf einem bestimmten Weg integrieren



→ Das heißt, wir lassen alle Punkte auf dem Weg  $\gamma$  durch die Abbildung und summieren es am Ende

$$\underbrace{\forall z \in \gamma \longrightarrow f(z) = \dots \longrightarrow \Sigma}_{\int_{\gamma} f(z) dz}$$

→ Um nur die komplexe Zahlen auf  $\gamma$  zu integrieren, verwenden wir die sogenannte Parametrisierung von  $\gamma$

→ Eine Parametrisierung ist eine Funktion  $\gamma: [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ , die für eine laufende Variable  $t$  im Intervall  $[a, b]$ , alle gewünschten komplexen Zahlen  $z$  auf dem Weg  $\gamma$  gibt **[Beispiel 3.1.1]**

→ So gilt dann

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \quad \text{[Beispiel 3.1.2]}$$

→ Eigenschaften

1. Linearität:  $\int_{\gamma} \alpha f(z) + \beta g(z) dz = \alpha \int_{\gamma} f(z) dz + \beta \int_{\gamma} g(z) dz$

2.  $\int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{-\gamma} f(z) dz \rightarrow -\gamma =$  die in umgekehrte Richtung durchlaufende Kurve

3. Ist  $\gamma$  eine Kette von Kurven  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_N$  so gilt  $\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_k^N \int_{\gamma_k} f(z) dz$

4. Durchläuft  $\gamma$  den Weg  $\tilde{\gamma}$   $k$  mal, so gilt  $\int_{\gamma} f(z) dz = k \int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz$

### 3.2 Cauchy-Integralsatz

→ Sei  $f: U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , eine in ganz  $U$  stetige Funktion. Dann gilt

1.  $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$  für alle geschlossene Kurven  $\gamma \in U$  [Beweis 3.2.1]  
 (unabhängig vom Weg) [Beispiel 3.2.1]


2.  $f(z)$  besitzt eine Stammfunktion  $F(z)$  mit  $F'(z) = f(z)$

→ Interpretation: Sei  $f: U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph,  $\gamma$  geschlossen,  $U$  einfach zusammenhängend

- Falls es innerhalb der von  $\gamma$  eingeschlossenen Fläche keine Singularität gibt, so ist  $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$
- Falls es jetzt eine Singularität innerhalb der von  $\gamma$  eingeschlossene Fläche gibt, so gilt die Aussage  $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$  nicht [Beispiel 3.2.2]

### 3.3 Homotopie Invarianz


→ Sei  $f: U \rightarrow \mathbb{C}$  eine analytische Funktion auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet  $U$  und  $\gamma_1, \gamma_2$  geschlossen. Das Integral über  $\gamma_1$  und  $\gamma_2$  ist gleich (und unabhängig vom Weg) sofern die Singularitäten innerhalb der von  $\gamma_1$  bzw  $\gamma_2$  eingeschlossene Fläche erhalten sind.



• Singularität von  $f(z)$

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz \quad [\text{Beweis 3.3.1}]$$

• Homotopie-Invarianz ermöglicht uns die Singularitäten zu isolieren



$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_0} f(z) dz + \int_{\gamma_1} f(z) dz$$

$$\int_{\gamma_3} f(z) dz = \sum_k^N \int_{\gamma_k} f(z) dz$$

[Beweis 3.3.2] [Beispiel 3.3.1]

### 3.4 Umlaufzahl


→ Sagt uns wie oft eine Singularität von einer Kurve  $\gamma$  umgelaufen wird

$\text{Ind}_\gamma(z_k) = u \Rightarrow$  Singularität  $z_k$  wurde  $u$ -mal von  $\gamma$  umgelaufen

$$\int_{\gamma_3} f(z) dz = \sum_k^N \text{Ind}_{\gamma_k}(z_k) \cdot \int_{\gamma_k} f(z) dz \quad [\text{Beispiel 3.4.1}]$$

→  $\text{Ind}_\gamma(z_i)$  berechnen

• Wir bilden eine Gerade von ausserhalb  $\gamma$  bis zur Singularität und zählen wie viele male  $\gamma$  unsere Gerade im positiven bzw negativen Sinn schneidet



$$2 \times \oplus + 1 \times \ominus = 1 \times \oplus \\ \Rightarrow \text{Ind}_\gamma(z_i) = 1$$

$$\left[ \begin{array}{l} \curvearrowright \oplus \text{ Math. positiv} \\ \curvearrowleft \ominus \text{ Math. negativ} \end{array} \right]$$

### 3.5 Integralformel von Cauchy

→ Sei  $f: U \rightarrow \mathbb{C}$  eine holomorphe Funktion auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet  $U$ . Dann gilt für jeden Punkt  $z_0 \in U$  und jede geschlossene Kurve  $\gamma$  in  $U$ , die  $z_0$  einmal im mathematisch positiven ( $\bar{\gamma}$ ) Sinn umläuft.

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

⚠  $f(z_0)$  ist  $f(z)$  ausgewertet an der Stelle  $z = z_0$   
[Beispiel 3.5.1]

• Wir integrieren  $\frac{f(z)}{z - z_0}$ , wobei es nur **eine** Singularität an der Stelle  $z = z_0$  innerhalb der von  $\gamma$  eingeschlossene Fläche gibt (da  $f(z)$  ganz in  $U$  ist)  
⇒ **keine Singularität von  $f(z)$  in  $A(\gamma)$**


→ Formel für die n-te Ableitung  $f^{(n)}$

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

$$f^{(n)}(z) = \frac{d^n}{dz^n} f(z) \quad [\text{Beispiel 3.5.2}]$$

### 3.6 Mittelwertsatz

→ Setze die Parametrisierung eines Kreises in der Integralformel von Cauchy ( $r=1$ )



$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it} + a) dt$$

Umfang eines Kreises mit Radius  $r=1$       alle Punkte auf dem Kreis  
(Radius = 1  
Mittelpunkt = a)

→ Interpretation

Auswertung der Funktion  $f$  an der Stelle  $a$  = Mittelwert der Umgebung

### 3.7 Maximumsprinzip

→ Realteil bzw. Imaginärteil einer holomorphen Funktion besitzt keine lokale Maxima oder Minima (Minimumsprinzip für Minima), ausser wenn sie konstant ist [Beispiel 3.7.1] [Beweis 3.7.1]

## 4. Residuensatz

### 4.1 Residuum

→ Definition: Der Residuum  $\text{Res}(f|z_0)$  der Funktion  $f$  an der Stelle  $z_0$  ist definiert als der  $(-1)$ -te Koeffizient  $C_{-1}$  der Laurententwicklung von  $f$  mit Entwicklungspunkt  $z_0$ .

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z-z_0)^k \quad \rightarrow \text{also das was } \frac{1}{z-z_0} \text{ multipliziert [Beispiel 4.1.1]}$$

→ Berechnung von  $\text{Res}(f|z_k)$

i. Pole  $n$ -te Ordnung

$$\text{Res}(f|z_i) := \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-z_i)^n f(z)] \quad [\text{Beweis 4.1.1}]$$

ii. Pole 1. Ordnung [Beispiel 4.1.2]

$$\text{Res}(f|z_i) = \lim_{z \rightarrow z_i} (z-z_i) f(z)$$

oder

$$\text{Res}(f|z_i) = \frac{h(z_i)}{g'(z_i)}$$

falls  $f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}$  und  $h(z_i) \neq 0$  ←

iii. Wesentliche Singularitäten

⇒ Laurententwicklung [Beispiel 4.1.1]

### 4.2 Residuensatz

→ Sei  $f: U \rightarrow \mathbb{C}$  eine holomorphe Funktion auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet  $U$ . Dann gilt für jede geschlossene Kurve  $\gamma$  in  $U$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \cdot \sum_k \text{Ind}_{\gamma}(z_k) \cdot \text{Res}(f|z_k)$$

[Beweis 4.2.1]  
[Beispiel 4.2.1]

wobei  $z_k$  innerhalb  $A(\gamma)$  liegt ←


### 4.3 Uneigentliche Integrale

→ Sei  $f$  eine absolut integrierbare Funktion in  $\mathbb{R}$  mit der Eigenschaft, dass sie schneller abfällt als  $x^{-2}$ . Dann gilt [Beweis 4.3.1] [Beispiel 4.3.1]

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}(f|z_k)$$

$\operatorname{Im}(z_k) > 0$

Residuensatz für  
Singularitäten mit  $\operatorname{Im}(z_k) > 0$




### 4.4 Integrale mit $e^{it}$ , $\cos(\cdot t)$ , $\sin(\cdot t)$

→ Im Abschnitt 3.1 haben wir die Parametrisierung von  $\gamma$  betrachtet. Mit der Parametrisierung eines Kreises mit Radius 1 und Mittelpunkt  $z=0$  ( $\Rightarrow \gamma(t) = e^{2\pi i t}$ ,  $t \in [0, T]$ ) können wir reelle Integrale wieder auf komplexwertige Integrale bringen (mit Hilfe einer „Rückparametrisierung“). Generell gilt: [Beweis 4.4.1] [Beispiel 4.4.1]

$$\int_{Tm+c}^{Tl+c} f(e^{\frac{2\pi i}{T}it}) dt = (l-m) \int_{|z|=1} f(z) \frac{1}{2\pi i z} dz$$

$l, m \in \mathbb{Z}, c \in \mathbb{R}$



→ Für  $\cos(\cdot t)$ ,  $\sin(\cdot t) \Rightarrow \cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ ,  $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$  [Beispiel 4.4.2]

→ So können wir reellwertige Integrale ganz einfach mit Residuensatz lösen

→ Das geht natürlich nur für Funktionen die nur  $e^{it}$  enthalten, wobei alle Exponentialfunktion die gleiche Periode haben.

# 5. Fourier

## 1. Fourier-Reihen

→ Eine Funktion heisst periodisch, falls

$$\exists p > 0, \text{ sodass } f(x+p) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$p$  heisst Periode von  $f$  (die kleinste Periode heisst *Fundamentalperiode*)

→ Gerade / Ungerade Fortsetzung

$f(x)$  = Stückweise-Funktion (Im Intervall  $[0, L]$ )

$\tilde{f}(x)$  = periodische Fortsetzung von  $f(x)$  (Im Intervall  $]-\infty, \infty[$ )

- Gerade Fortsetzung von  $f(x) \Rightarrow \tilde{f}(x)$  ist gerade ( $\tilde{f}(-x) = \tilde{f}(x)$ )
  - Ungerade Fortsetzung von  $f(x) \Rightarrow \tilde{f}(x)$  ist ungerade ( $\tilde{f}(-x) = -\tilde{f}(x)$ )
- [Beispiel 5.1.1]

→ Darstellung von periodische Funktionen durch trigonometrische Funktionen ( $\cos(x)$ ,  $\sin(x)$ )

→ Ein trigonometrisches Polynom mit Grad  $N$  ist eine Linearkombination von trigonometrische Funktionen:

$$\sum_{k=0}^N a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt) \quad \text{oder} \quad \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikt}$$

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{\frac{2\pi i k t}{T}}$$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{2\pi k t}{T}\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi k t}{T}\right)$$

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-\frac{2\pi i k x}{T}} dx \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos\left(\frac{2\pi}{T} k x\right) dx \quad (k \geq 0)$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{T} k x\right) dx \quad (k \geq 1)$$

→ Eigenschaften

$$(1) \int_{-a}^a f(x) g(x) dx \text{ mit } \left. \begin{array}{l} \rightarrow f(-x) = f(x) \text{ (gerade)} \\ \rightarrow g(-x) = -g(x) \text{ (ungerade)} \end{array} \right\} \Rightarrow \int_{-a}^a f(x) g(x) = 0$$

• Symmetrisches Integrieren (von  $-a$  bis  $a$  für  $a \in \mathbb{R}$ ) einer ungeraden und geraden Funktion ist immer Null

(2)  $\cos(x)$  ist eine gerade Funktion  $[\cos(-x) = \cos(x)]$   
 $\sin(x)$  ist eine ungerade Funktion  $[\sin(-x) = -\sin(x)]$

(3)

$\left. \begin{array}{l} g(x) \text{ gerade} \\ u(x) \text{ ungerade} \end{array} \right\}$	• $g(x) \cdot u(x)$ ist ungerade
	• $g(x) \cdot g(x)$ und $u(x) \cdot u(x)$ sind gerade
	• $\int_{-a}^a u(x) dx = 0$
	• $\int_{-a}^a g(x) dx = 2 \int_0^a g(x) dx$

(4) Für die Fourier-Koeffizienten gilt also

$f(x)$  gerade ( $f(-x) = f(x)$ )

$$b_k = 0 \quad \forall k$$

$$a_k = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(x) \cos\left(\frac{2\pi kx}{T}\right) dx$$

$f(x)$  ungerade ( $f(-x) = -f(x)$ )

$$a_k = 0 \quad \forall k$$

$$b_k = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(x) \sin\left(\frac{2\pi kx}{T}\right) dx$$

[Beispiel 5.1.2]

(5) Für  $a_k, b_k$  und  $c_k$  muss man nur durch eine ganze Periode integrieren, egal wo man startet

$$\begin{aligned} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-\frac{2\pi}{T} kx} dx &= \int_a^b f(x) e^{-\frac{2\pi}{T} kx} dx \text{ sofern } b-a = T \\ &= \int_{c-T/2}^{c+T/2} f(x) e^{-\frac{2\pi}{T} kx} dx, \quad c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

→ Umformeln (komplex  $\leftrightarrow$  reell)

$$a_k = c_k + c_{-k} \quad \text{und} \quad b_k = i(c_k - c_{-k}) \quad \text{für } k > 0$$

$$c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k) \quad \text{und} \quad c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k) \quad \text{für } k > 0$$



→ Satz von Dirichlet

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) = \frac{f(t+) + f(t-)}{2}$$

→ Satz von Parseval: Sei  $f$  eine  $2\pi$ -periodische reellwertige Funktion  
Dann gilt: [Beispiel 5.1.3]

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (|a_k|^2 + |b_k|^2)$$

## 2. Fouriertransformation

$$F\{f\}(\omega) = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad [\text{Beispiel 5.2.1}]$$

→ Eigenschaften

1.  $F\{f(t) + g(t)\} = \hat{f}(\omega) + \hat{g}(\omega)$

2.  $F\left\{\frac{d}{dt} f(t)\right\} = i\omega \hat{f}(\omega)$

3.  $F\{t f(t)\} = i \frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega)$

4.  $F\{f(t-a)\} = e^{-i a \omega} \hat{f}(\omega)$

5.  $F\{f(t) \cdot g(t)\} = \hat{f}(\omega) * \hat{g}(\omega)$  [Faltung]

[Beispiel 5.2.2]

→ Satz von Plancherel

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(s)|^2 ds \quad [\text{Beispiel 5.2.3}]$$

## 6. Laplace

### 1. Laplace - Transformation

$$\mathcal{L}\{f\}(s) := \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

→ Existenz der Laplace-Transformation

1. Die Funktion muss von *exponentieller Ordnung* sein, das heisst,

$$\exists C, s_0 > 0 \text{ s.d. } |f(t)| \ll C e^{s_0 t} \text{ für } t > 0$$

→  $|f(t)|$  darf nicht schneller als  $C e^{s_0 t}$  wachsen, weil sonst  $f(t) \cdot e^{-st}$  divergiert  
⇒ Integral  $\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}\{f\}(s)$  divergiert (existiert nicht)


2. Integrierbarkeit  $\int_0^T |f(t)| dt < \infty, T > 0$

⇒ bereits erfüllt, wenn  $f(t)$  *stückweise stetig* in  $t \in [0, \infty]$  ist

• Wenn 1. und 2. erfüllt sind, so existiert  $\mathcal{L}\{f\}(s)$  für  $\operatorname{Re}\{s\} > s_0$ .

[Beispiel 6.1.1]

→ Darstellung (Doetsch-Symbole  $\circ \bullet$ )



Beispiel:

$$\begin{aligned} f(t) &\circ \bullet F(s) \\ \frac{d}{dt} f(t) &\circ \bullet sF(s) - f(0) \\ t^n e^{-at} &\circ \bullet \frac{n!}{(s+a)^{n+1}} \end{aligned}$$

[Beispiel 6.1.2]

→ Lösen von Differentialgleichungen: mit  $\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} f(t)\right\} = sF(s) - f(0)$ ,  $F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$

[Beispiel 6.1.3]

# Tipps

## → Komplexwertige Integrale

- Weg geschlossen  $\Rightarrow$  Residuensatz, Weg offen  $\Rightarrow$  Parametrisierung
- Keine Singularität im Integrationsweg  $\Rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = 0$
- Residuensatz 4 life  $\rightarrow$  keine Integralformel (man kann alles mit Residuensatz lösen)

## → Reihen

- Polynom im Nenner  $\Rightarrow$  Geometrische Reihe [+ Partialbruchzerlegung]

Konvergenzradius beachten!  $\frac{1}{1-q} = \sum_{k=0}^{\infty} q^k, |q| < 1$

- $e^z, \cos(-z), \sin(-z) \dots \Rightarrow$  Taylorreihe

## → Residuum

- $\text{Res}(f|a) = C_{-1}$  von  $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z-a)^k$

- Grad der Singularität bestimmen  $\Rightarrow$  entsprechende Formel verwenden

## → Reellwertige Integrale

- $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$  mit  $f \leq O(t^{-2}) \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 2\pi i \sum_{\substack{k \\ \text{Im} > 0}} \text{Res}(f|z_k)$  [Bsp.:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(x)}{x^3+3} dx$ ]

- $\int_{Tm+c}^{Tl+c} f(e^{\frac{2\pi i t}{T}}) dt = (l-m) \int_{|z|=1} f(z) \cdot \frac{1}{2\pi i z} dz$  [ $l, m \in \mathbb{Z}, c \in \mathbb{R}$ ] [Bsp.:  $\int_0^{4\pi} \frac{\cos(t)}{2e^{it}+3} dt$ ]

## → Fouriertransformation

- Gut zu wissen:  $\mathcal{F}\{f \cdot g\} = (F * G)(s)$
- Muss man den Wert eines Integrals berechnen, welches irgendwie das Quadrat von  $\hat{f}(t)$  ist  $\Rightarrow$  Plancherel

## → Fourierreihe

- Was so aussieht wie eine Fourierreihe, ist auch eine Fourierreihe
- Ist  $f$  gerade oder ungerade?  $\Rightarrow a_n = 0$  oder  $b_n = 0$
- Muss man den Wert einer Summe berechnen, welche irgendwie das Quadrat von  $c_k$  oder  $a_k, b_k$  ist  $\Rightarrow$  Parseval

→ Laplace transformation

• Differentialgleichung  $\Rightarrow \frac{d}{dt} f(t) \leftrightarrow sF(s) - f(0)$

$$\Rightarrow \frac{d^n}{dt^n} f(t) = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

$\Rightarrow$  Auf  $F(s)$  lösen  $\Rightarrow$  Partialbruchzerlegung +  $\frac{n!}{(s+a)^{n+1}} \leftrightarrow t^n e^{-at}$